

MADUREL®

ABONO ESPECIAL PARA LA FASE DE MADURACIÓN - Abono con Aminoácidos -

CONTENIDO DECLARADO

Potasio (K ₂ O) soluble en agua	20,0% p/p (27,6% p/v)
Prolina	2,0% p/p (2,76% p/v)
Ácidos orgánicos	30,0% p/p (41,4% p/v)

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA

MADUREL® está especialmente indicado para su uso en frutales y uva de mesa para la fase de maduración. **MADUREL®** mejora los parámetros de calidad de los frutos – como el contenido de azúcares, la coloración – y de producción – calibre y peso de frutos.

DOSIS Y APLICACIÓN

- Frutales y uva de mesa:

Como recomendación general, realizar dos-tres aplicaciones foliares: 45, 30 y 15 días antes de la fecha prevista de cosecha, a una dosis de 2-3 L/ha.

MADUREL®

MADUREL® mejora la producción y calidad de las cosechas. Su particular formulación le confiere una gran efectividad en momentos fundamentales de su ciclo, para obtener cosechas de calidad. Está especialmente indicado para su aplicación en la fase de maduración de frutales y uva de mesa.

RD 824 / 2005
Fertilizantes
BUREAU VERITAS
Certification




Daymsa
DESARROLLO AGRÍCOLA Y M NERO, S. A.

Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
www.daymsa.com