

## Cerezo en seco

	VÍA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	ANUAL		
<b>Naturcomplet-G</b>	Suelo	16-25 Kg/hg	200-300 Kg/ha	Invierno, 1-2 meses antes brotar	Una aplicación anual
<b>Naturvigor</b>	Suelo	125-160 Kg/hg	1.500-2.000 Kg/ha	Invierno, 1-2 meses antes brotar	Una aplicación anual
<b>Naturamin</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	Variable	Aprovechando tratamientos	1-2 aplicaciones, como ayuda en heladas
<b>Naturamin-Plus</b>	Foliar	200-250 cc/Hl	Variable	Aprovechando tratamientos	1-2 aplicaciones, como ayuda en heladas
<b>Naturquel-Ca</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	1-1,5 l/ha	A partir de cuajado y a los 20 días	Prevención de rajado, una o dos aplicaciones
<b>Naturfós</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	1-1,5 l/ha	Tratamiento preventivo en lluvias	Opcional, uno o dos tratamientos anuales
<b>Naturfós-Ca</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	1-1,5 l/ha	A partir de cuajado y a los 20 días	Prevención de rajado, una o dos aplicaciones
<b>Naturfruit</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	1-1,5 l/ha	A partir del cuajado	Dos tratamientos separados 15-20 días.
<b>Naturfruit-Basic</b>	Foliar	200-300 cc/Hl	1-1,5 l/ha	A partir del cuajado	Dos tratamientos separados 15-20 días.