

## Vivero de cítricos

	VIA	DOSIS		ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERIODICIDAD
		POR APLICACIÓN	ANUAL		
<b>Naturvigor</b>	Suelo	3000 Kg/ha	3000 Kg/ha	Un mes antes de la plantación	En tierras nuevas a plantar. Una vez
<b>Naturvital-16</b>	Suelo	15-20 l/ha	40-60 l/ha	Tras el trasplante y brotación	Dos aplicaciones
<b>Naturvital-Plus</b>	Suelo	15-20 l/ha	40-60 l/ha	Tras el trasplante y brotación	Dos aplicaciones
<b>Naturamin</b>	Foliar	300-500 cc/HL	Variable	Cada 7-15 días	Varias aplicaciones, según ciclo y vivero
<b>Naturamin-Plus</b>	Foliar	200-300 cc/HL	Variable	Cada 7-15 días	Varias aplicaciones, según ciclo y vivero
<b>Naturmix-L</b>	Foliar	200-300 cc/HL	Variable	Una vez al mes	Varias aplicaciones, según ciclo y vivero
<b>Naturquel-Fe</b>	Suelo	2-4 Kg/ha	6-12 Kg/ha	Febrero a septiembre	Varias aplicaciones
<b>Naturquel-Fe-L</b>	Foliar	150-200 cc/HL	Variable	Febrero, marzo, abril	Varias aplicaciones cada quince días
<b>Naturfós</b>	Foliar	300 cc/HL	Variable	Primavera, verano, otoño	1-2 aplicaciones/época de aplicación
<b>Raiza</b>	Suelo	5 l/ha	10-15 l/ha	En trasplante	En los primeros riegos

**:: FICHA DE CULTIVO ::** Para mayor exactitud en las dosis contacte con el Departamento Técnico de DAYMSA